

TESTE DE CANCELAMENTO DE ESTRELAS

Evidência revisada em 19/08/2008

Autores(as): Lisa Zeltzer, MSc OT; Anita Menon, MSc.

Editores(as): Nicol Korner-Bitensky, PHD OT; Elissa Sitcoff, BA Bsc.

Objetivo

O teste de cancelamento de estrelas é uma ferramenta de triagem desenvolvida para detectar a presença de Negligência Espacial Unilateral (NEU) do espaço próximo em pacientes com AVC.

Versões disponíveis

O teste de cancelamento de estrelas foi desenvolvido por Wilson, Cockburn e Halligan em 1987.

Características da medida

Não há itens reais no teste de cancelamento de estrelas. No teste os estímulos são 52 estrelas grandes, 13 letras e 10 palavras curtas intercaladas com 56 estrelas menores. O paciente deve riscar com um lápis todas as estrelas menores em uma folha tamanho Carta (21,59 x 27,94 cm). Duas estrelas menores, alinhadas com a seta inferior da folha, devem ser usadas para demonstração. A folha deve ser presa à mesa na linha média do paciente.

Pontuação

A pontuação máxima a ser alcançada no teste é de 54 pontos (56 estrelas menores menos as duas utilizadas para demonstração). Um ponto de corte menor que 44 indica a presença de Negligência Espacial Unilateral (NEU). Um índice de lateralidade ou proporção de estrelas pode ser calculado a partir da proporção de estrelas menores canceladas a esquerda da folha em relação ao número total de estrelas canceladas. Pontuações entre 0 e 0,46 indicam NEU no hemi-espaço esquerdo e pontuações entre 0,54 e 1 indicam NEU no hemi-espaço direito.

Tempo

Menos do que 5 minutos.

Treinamento

Nenhum relatado.

Subescalas

Nenhuma.

Equipamentos

- A folha de teste (tamanho papel carta com 21,59 x 27,94 cm) com 52 estrelas maiores, 13 letras, 10 palavras curtas intercaladas com 56 estrelas menores);
- Lápis.

Adequação do paciente

- Pacientes pós-AVC;
- Os pacientes devem ser capazes de segurar um lápis para completar o teste (a presença de apraxia pode prejudicar esta capacidade);
- Os pacientes devem ser capazes de discriminar visualmente entre os itens distratores, como as palavras e as estrelas maiores, e as estrelas pequenas que serão canceladas.

Não deve ser usado com

- Tal como acontece em outros testes de cancelamento, o teste de cancelamento de estrelas não pode ser usado para diferenciar entre negligência sensorial e negligência motora porque requer busca visual e exploração manual (Ladavas, 1994);
- O teste de cancelamento de estrelas não pode ser completo via proxy.

Referência: [Star Cancellation Test – Strokengine](#)